

Dipartimento Prevenzione, Epidemiologia,
Programmazione e Controlli.

Allegato n.1

Genova, data del protocollo

Ai Direttori Sanitari delle AASSLL e
Ospedale Pediatrico Istituto Giannina
Gaslini

Al Dottor Michele Fiore

Al Dottor Giorgio Conforti

Oggetto: Identificazione percorso vaccinazione anti Covid-19 fascia di età 5-11 anni per i soggetti vulnerabili allergici.

In relazione a quanto già comunicato per le vie brevi, si conferma che per la campagna di vaccinazione anti Covid fascia di età 5-11 anni per i soggetti vulnerabili allergici viene identificato il seguente percorso.


Il pediatra che ha in cura il soggetto identifica il rischio allergologico secondo linee guida, effettua segnalazione su Poliss su anagrafe sanitaria, escludendo in tal modo la possibilità che possa essere prenotato attraverso il portale ordinario "prenotovaccino". La segnalazione su Poliss vale come richiesta di attivazione del percorso dalla valutazione allergologica prevaccinale, fino all'esecuzione di vaccino in ambiente protetto.

I soggetti così identificati possono essere conferiti su apposita agenda di vaccinazione all'uopo allestita in ambiente protetto presso gli ambulatori delle rispettive Unità Operative di Pediatria ospedaliera.

Sarà cura dell'Istituto Gaslini organizzare il percorso vaccinale protetto in ambiente ospedaliero con equipe dedicata per il territorio di competenza ASL3 e per pazienti complessi che gli specialisti di altre AASSLL ritenessero opportuno inviare. Si allega per opportuna conoscenza il documento elaborato dal Centro Allergologico dell'Istituto Giannina Gaslini.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni Battista Andreoli)



Gestione della vaccinazione per COVID-19 in soggetti di età 5-11 aa con allergie, asma, anafilassi

Indicazioni elaborate a cura del Centro Allergologia dell'Istituto Giannina Gaslini, Genova

FASCIA VERDE – basso rischio → non è necessaria una valutazione allergologica

- 1) oculorinite e asma allergico **controllato**
- 2) reazioni allergiche non anafilattiche (da alimenti, punture di insetto o lattice)

N.B. La terapia antiallergica /antiasmatica va proseguita regolarmente.

Per quanto concerne i pazienti trattati con **immunoterapia specifica (ITS)** si consiglia di sospendere la somministrazione dell'immunoterapia per circa 48-72 ore prima e dopo il vaccino Covid.

FASCIA GIALLA – medio rischio → è necessaria una valutazione allergologica

- 1) reazioni allergiche di tipo anafilattico indotte da alimenti, punture di insetti o lattice
- 2) anafilassi idiopatica e anafilassi da sforzo
- 3) asma persistente **NON controllato**

^ L'asma non è controllato se il bambino nelle ultime 4 settimane ha presentato almeno una di queste condizioni:

- Sintomi giornalieri di asma >2 volte/settimane
- Risvegli notturni dovuti all'asma
- Necessità di broncodilatatori >2 volte/settimane
- Limitazione delle normali attività a causa dell'asma

- 4) mastocitosi
- 5) reazione cutanea locale estesa alla prima somministrazione di vaccinazione anti- SARS CoV-2
- 6) reazioni allergiche (o avverse) immediate a farmaci o vaccini

FASCIA ROSSA – ALTO RISCHIO → è necessaria una valutazione allergologica

- 1) Reazione generalizzata al vaccino anti-Covid-19 o a sostanze che contengono gli eccipienti del vaccino anti-COVID-19 (PEG, polisorbati)
- 2) Casi di positività ai test cutanei per gli eccipienti del vaccino o di reazioni gravi o dubbie a vaccini o farmaci che contengono PEG o polisorbati.

BIBLIOGRAFIA

- Gestione della vaccinazione per COVID-19 in soggetti di età 12-18 anni con allergie, asma, anafilassi e immunodeficienze SIAIP Novembre 2021
- AAIITO/SIAAIC Linee di indirizzo per la gestione da parte degli allergologi dei pazienti a rischio di reazioni allergiche ai vaccini per COVID-19 Versione 15/02/21